

P ANTIPARAZITICI, INSEKTICIDI I REPELENTI

P01 ANTIPROTOZOICI

P01A Amebicidi i drugi lijekovi za liječenje bolesti koje su izazvane protozoama

P01AB Derivati nitroimidazola

P01AB02 tinidazol

Doziranje: *Oralno:* odrasli: 2 g odjednom; djeca: 50-60 mg/kg dnevno. Kod crijevne amebijaze terapija traje 2-3 dana, kod hepatičke amebijaze 3 do 6 dana, a kod dardijaze i trihomonasnog vaginitisa 1 dan.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TRIAGIL - GALENIKA a.d.

Rp film-tablete [500 mg] 4 film-tablete

P01AB07 seknidazol

Doziranje: Akutna intestinalna amebijaza: Odrasli: primjena pojedinačne oralne doze od 2 g seknidazola. Djeca: primjena pojedinačne oralne doze od 30mg/kg seknidazola. Hepatička amebijaza: Odrasli: primjena pojedinačne dnevne doze od 1,5g seknidazola tokom 5 dana. Djeca: primjena pojedinačne dnevne doze seknidazola od 30mg/kg tokom 5 dana. Giardijaza: odrasli: primjena pojedinačne oralne doze od 2g seknidazola. Osim inficiranih osoba treba tretirati članove porodice i osobe koje su u kontaktu sa oboljelim. Trihomonadni vaginitis: odrasli: primjena pojedinačne oralne doze od 2g seknidazola. Kako bi se smanjila stopa reinfekcije, istovremeno se tretira seksualni partner žene sa infekcijom. Bakterijski vaginitis: jednokratna doza seknidazola od 2g.

Registrovani lijekovi:

SECNEZOL - BOSNALIJEK d.d.

Rp film-tablete [500 mg] 4 tablete

SEZOL - FARMAVITA d.o.o. Sarajevo

Rp tablete [500 mg] 4 tablete

P01AX Ostali amebicidi i drugi lijekovi za liječenje bolesti koje su izazvane protozoama

P01AX08 tenonitrozol

Doziranje: Odrasli na 12 h po 250 mg uz obrok u toku 4 dana.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ATRICAN - LABORATOIRE INNOTHERA-INNOTECH INTERNATIONAL

Rp meke gastorozistentne kapsule [250 mg] 8 mekih gastorozistentnih kapsula

P02 ANTHELMINTICI

P02C Lijekovi protiv nematoda

P02CA Derivati benzimidazola

P02CA01 mebendazol

Doziranje: *Oksiurijaza:* odrasli i djeca: 1 doza od 100 mg; *strongiloidoza:* po 200 mg ujutro i uveče, 3 dana uzastopno; *ostale indikacije:* dovoljno je po 100 mg ujutro i uveče, 3 dana uzastopno.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**BENDAZOL - BOSNALIJEK d.d.**

Rp suspenzija [100 mg/5 ml] 30 ml suspenzije

Rp tablete [100 mg] 6 tableta

MEBENDAZOL - ZDRAVLJE A.D.

Rp tablete [100 mg] 6 tableta

SOLTRIK - GALENIKA a.d.

Rp oralna suspenzija [100 mg/5 ml] 30 ml

VERMOX - KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Rp oralna suspenzija [100 mg/5 ml] 30 ml

Rp tablete [100 mg] 6 tableta

P03 LIJEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA, UKLJUČUJUĆI I SKABICIDE, INSEKTICIDE I REPELENTE**P03A Lijekovi protiv ektoparazita i skabijesa****P03AC Piretrini, uključujući sintetska jedinjenja****P03AC01 piretrin**

Doziranje:Odrasli i starija djeca: na kosu se nanosi 1/2 sadržaja bočice (2 supene kašike), a kod mlađe djece 1 supena kašika šampona. Prije upotrebe šampona kosu natopiti toplom vodom. Kosa se trlja nekoliko minuta, zatim obilno ispere toplom vodom. Kosa se briše i suši suvim neupotrebljivanim peškirom, a potom se isčešlja gustim češljem. Postupak se ponavlja i drugog dana. Ukoliko osoba ima i dalje gnjide i vaške, šampon se koristi još jednom poslije 8-10 dana. Kod pubične vašljivosti način primjene je isti, mada treba da se misli na kontraindikacije i mjere opreza. Kada se lijek upotrebljava za liječenje pedikuloze stidne regije, obavezno je sprovesti paralelno liječenje oba partnera, zbog lakog širenja i prenošenja ove oblika zaraze.

REGISTROVANI LIJEKOVI:**BUBIL - JUGOREMEDIJA fabrika lekova a.d. Zrenjanin**

BRp šampon [180 mg/60 ml] 60 ml šampona