

S SENZORNI ORGANI

S01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA

S01A Antiinfektivi

S01AA Antibiotici

S01AA01 hloramfenikol

Doziranje: Malu količinu masti nanijeti u konjunktivalnu kesu svaka 3 sata tokom prvih 48 sati terapije. Poslije toga, interval između doza povećati. Terapiju produžiti najmanje 48 sati po nestanku znakova infekcije.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CHLORAMPHENICOL - GALENIKA a.d.

Rp mast za oči [10 mg/g] 5 g masti za oči

CHLORAMPHENICOL ALKALOID - ALKALOID AD

Rp mast za oči [10 mg/g] 5 g masti za oči

CHLORAMPHENICOL KRKA - KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Rp mast za oči [10 mg/g] 5 g

HLORAMKOL - HEMOFARM A.D. Vršac

Rp mast za oči [10 mg/g] 5 g masti za oči

S01AA11 gentamicin

Doziranje: Svaka 4 sata po 1-2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu. Mast se nanosi na konjunktivu 2-4 puta dnevno i uveče prije spavanja.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

GARAMYCIN - KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Rp mast za oči [3 mg/g] 3 g masti za oči

GENTOKULIN - HEMOFARM A.D. Vršac

Rp kapi za oči [3 mg/ml] 10 ml otopine

S01AA12 tobramicin

Doziranje: Kapi: lakše i srednje infekcije 1-2 kapi u oboljelo oko (oči) svaka 4 sata; teške infekcije: po 2 kapi u oko (oči) svakog sata. Mast: lakše i srednje infekcije: 2-3 puta na dan; kod teških infekcija nanijeti 1,5 cm masti u oboljelo oko (oči) svaka 3-4 sata do poboljšanja simptoma.

TOBREX - ALCON PHARMACEUTICALS LTD

Rp kapi za oči [3 mg/ml] 5 ml

Rp mast za oči [3 mg/g] 3,5 g

TOBREXAN - ALCON PHARMACEUTICALS LTD

Rp kapi za oči [3 mg/ml] 5 ml

S01AA30 bacitracin, neomicin

Doziranje: mazati 2-5 puta na dan.

Na donji očni kapak ili u vanjski slušni kanal ukapati 1-2 kapi 4-5 puta na dan. Vrlo teške infekcije: ukapavati 2 kapi svaki sat.

ENBECIN - GALENIKA a.d.

Rp mast za kožu i oči [(3.300 i.j. + 500 i.j.)/g] 5 g masti za kožu i oči

BIVACYN - LEK farmacevtska družba d.d.

Rp kapi za oči i uši [(3500 i.j. + 250 i.j.)/ml] 1 bočica praška i otapala

Rp mast za oči [(3500 i.j. + 250 i.j.)/g] 3,5 g

S01AD Antivirolici**S01AD03 aciklovir**

Doziranje: 1,5 cm masti nanijeti u donju konjunktivalnu kesu bolesnog oka svaka 4 h. Nakon nestanka simptoma bolesti mast primjenjivati još, najmanje, 3 dana.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ACIKLOVIR ALKALOID - ALKALOID AD

Rp mast za oči [30 mg/g] 5 g

VIROLEX - KRKA, tovarna zdravil, d.d.

Rp mast za oči [30 mg/g] 4,5 g

S01AX Ostali antiinfektivni**S01AX13 ciprofloksacin**

Doziranje: *Bakterijski konjunktivitis:* prva dva dana 1 do 2 kapi ukapati u konjunktivalnu kesu svaka 2 h, a zatim svaka 4 h kroz 7 dana. *Keratitis/ulcus corneae:* prvi dan 2 kapi svakih 15 minuta u toku 6 h, zatim 2 kapi svakih 30 minuta do kraja dana; drugi dan 2 kapi svakog sata, a od 3. do 14. dana kapati u oko 2 kapi na 4 h tokom dana.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CITERAL 0,3% - ALKALOID AD

Rp kapi za oči i uši, otopina [3 mg/ml] 5 ml

MAROCEN - HEMOFARM A.D. Vršac

Rp kapi za oči, rastvor [3 mg/ml] 5 ml

S01B Antiinflamatorni lijekovi**S01BA Kortikosteroidi, monokomponentni****S01BA01 deksametazon**

Doziranje: Kapi: 4-6 puta po 1-2 kapi; mast do 4 puta dnevno nanositi u konjunktivalnu kesu.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MAXIDEX - ALCON PHARMACEUTICALS LTD

Rp kapi za oči [1 mg/ml] 5 ml suspenzije

Rp mast za oči [1 mg/g] 3,5 g masti

S01BA02 hidrokortizon

Doziranje: Primjenjuje se lokalno svaka 3-4 sata tako što se malo masti stavlja na posuvraćeni donji očni kapak.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HYDROCORTISON - GALENIKA a.d.

Rp mast za oči [10 mg/g] 5 g masti za oči

S01BA04 prednizolon

Doziranje: U početku se ukapa po 1-2 kapi svakog sata u toku dana, a svaka 2 sata tokom noći; kad dođe do poboljšanja, lijek se može ukapavati svaka 4 sata.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

OFTALMOL - HEMOFARM A.D. Vršac

Rp kapi za oči, suspenzija [5 mg/ml] 5 ml

S01BC Nesteroidni antiinflamatorni lijekovi

S01BC03 diklofenak

Doziranje: 3-5 puta na dan po 1-2 kapi, do poboljšanja.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

UNICLOPHEN 0,1% - UNIMED PHARMA s.r.o.

Rp kapi za oči, rastvor [1 mg/ml] 10 ml

S01C Antiinflamatorni lijekovi i antiinfektivi u kombinaciji

S01CA Kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji

S01CA01 deksametazon, neomicin, polimiksin B

Doziranje: Kapi za oči: Dozira se u kapima. Jednu do dvije kapi ukapati u konjunktivalnu kesicu ovoljelog oka svaka 2-4 sata. U teškim slučajevima, kapi se mogu primjenjivati svaki sat. Kada se postigne zadovoljavajući terapijski odgovor, odnosno kad se upala smanji, doza se postepeno smanjuje do potpunog prestanka primjene lijeka. U tretmanu blagih upala, kapi se mogu primjenjivati svaka 4-6 sati. Mast: aplicirati malu količinu masti u konjunktivalnu vrećicu tri do četiri puta na dan, ili primjenjivati zajedno sa kapima uveče pred spavanje.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MAXITROL - ALCON PHARMACEUTICALS LTD

Rp kapi za oči [(1 mg + 3500 i.j. + 6000 i.j.)/ml] 5 ml

Rp mast za oči [(1 mg + 3500 i.j. + 6000 i.j.)/ml] 3,5 g

S01CA03 hidrokortizon, bacitracin

Doziranje: 3 do 4 puta na dan staviti malo masti u konjunktivalnu kesu.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

CORTICIN - GALENIKA a.d.

Rp mast za oči [(10 mg + 1000 i.j.)/g] 3,5 g masti za oči

S01E Lijekovi za liječenje glaukoma i miotici

S01EB Parasimpatomimetici

S01EB01 pilokarpin

Doziranje: 1-2 kapi u donju konjunktivalnu vreću 3-4 puta na dan. Pri liječenju akutnog glaukoma 1-2 kapi svakih 15 minuta tokom 2 sata do nastupa poboljšanja, a zatim svakih 30 minuta.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

MIOKARPIN - HEMOFARM A.D. Vršac

Rp kapi za oči, rastvor [20 mg/ml] 10 ml

S01EC Inhibitori karboanhidraze

S01EC03 dorzolamid

Doziranje: Ako se uzima samo dorzolamid, ukapava se jedna kap u bolesno oko (oči) ujutro, poslijepodne i navečer. Ako je za sniženje povišenog očnog pritiska lekar propisao dorzolamid u kombinaciji sa kapima za oči koje sadrže beta blokator, treba se ukapati jedna kap dorzolamida u bolesno oko (oči) ujutro i navečer. Ako se primjenjuje

dorzolamid u kombinaciji s drugim kapima za oči treba ih ukapavati u razmacima od najmanje deset minuta.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TRUSOPT - MERCK SHARP & DOHME IDEA Inc.

Rp kapi za oči, rastvor [20 mg/ml] 5 ml

S01EC04 brinzolamid

Doziranje: 1 kap u donju konjunktivalnu vrećicu bolesnog oka 3 puta na dan. Ukoliko se kombinuje sa β -blokatorima preporučuje se ukapavanje 1-2 kapi 2 puta na dan u donju konjunktivalnu vrećicu. Ukoliko se provodi ovakva terapija, preporučuje se primjena lijekova sa razmakom od 10 minuta. Prije upotrebe promućkati.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

AZOPT - ALCON PHARMACEUTICALS LTD

Rp kapi za oči [10 mg/ml] 5 ml

S01ED Blokatori beta-adrenergičkih receptora

S01ED01 timolol

Doziranje: Liječenje se, obično, započinje 0,25% rastvorom, jedna kap u oko, 1-2 puta dnevno. U težim slučajevima preporučuje se primjena 0,5% rastvora.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

GLAUMOL - GALENIKA a.d.

Rp kapi za oči, rastvor [5 mg/ml] 5 ml

TIMADREN - HEMOFARM A.D. Vršac

Rp kapi za oči, rastvor [5 mg/ml] 5 ml

TIMALEN - JADRAN - Galenski laboratorij d.d.

Rp kapi za oči [2,5 mg/ml] 5 ml

Rp kapi za oči [5 mg/ml] 5 ml

TIMOLOL Farmavita - FARMAVITA d.o.o. Sarajevo

Rp kapi za oči [5 mg/ml] 5 ml

S01ED02 betaksolol

Doziranje: 1 - 2 kapi dva puta na dan u oboljelo oko (oči).

REGISTROVANI LIJEKOVI:

BETOPTIC S - ALCON PHARMACEUTICALS LTD

Rp kapi za oči [2,5 mg/ml] 5 ml

S01ED51 timolol, latanoprost

Doziranje: Jedna kap dnevno u bolesno oko (oči). Ukoliko se upotrebljava više od jednog topikalnog oftalmološkog lijeka, trebaju se uzimati u razmaku od minimalno 5 minuta. Kontaktne leće izvaditi prije stavljanja kapi za oči (mogu se vartiti nakon 15 minuta). Sigurnost i efikasnost primjene lijeka u djece nisu ustanovljeni.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

XALACOM - PFIZER LUKSEMBURG SARL

Rp kapi za oči [(5 mg + 50 mcg)/ml] 2,5 ml

S01ED51 timolol, dorzolamid

Doziranje: 1 kap dva puta na dan u oboljelo oko.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

COSOPT - MERCK SHARP & DOHME IDEA Inc.

Rp kapi za oči, rastvor [(20 + 5) mg/ml] 5 ml

S01EE *Analozii prostaglandina*

S01EE01 *latanoprost*

Doziranje: Jedna kap u oboljelo oko jedanput na dan. Optimalni efekat se postiže primjenom latanoprostu uveče.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

XALATAN - PFIZER LUKSEMBURG SARL

Rp kapi za oči, rastvor [50 mcg/ml] 2,5 ml kapi za oči, rastvora

S01EE04 *travoprost*

Doziranje: Odrasli (uključujući starije osobe): jedna kap dnevno u vrećicu očne spojnice. Optimalan efekat postiže se primjenom uveče. Nakon ukapavanja preporučuje se nazolakrimalna okluzija ili lagano zatvaranje očnog kapka. Ovo može smanjiti sistemsku apsorpciju. U slučaju primjene uz druge kapi za oči preporučuje se vremenski razmak od 5 minuta između ukapavanja. Kada se zamjenjuje drugi antiglaukomski lijek potrebno je prekinuti sa terapijom drugog lijeka, a travaprost primijeniti tek slijedećeg dana. Ne preporučuje se primjena kod djece.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

TRAVATAN - ALCON PHARMACEUTICALS LTD

Rp kapi za oči [40 mcg/ml] 2,5 ml

S01F *Midrijatici i cikloplegici*

S01FA *Antiholinergici*

S01FA01 *atropin*

Doziranje: u dijagnostičke svrhe: 1-2 kapi u donju konjunktivalnu vreću 2-3 puta na dan u toku tri dana. U terapijske svrhe: 1-2 kapi u donju konjunktivalnu vreću 1-3 puta na dan.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ATROPIN - HEMOFARM A.D. Vršac

Rp kapi za oči, rastvor [10 mg/ml] 10 ml

Rp kapi za oči, rastvor [5 mg/ml] 10 ml

S01G *Dekongestivi i antialergici*

S01GA *Simpatomimetici kao dekongestivi*

S01GA01 *nafazolin*

Doziranje: Ukapati 1-2 kapi u konjunktivalnu kesu, najviše 4 puta na dan. Preporučeno vrijeme trajanja tretmana je 3 do 4 dana.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HEMOKULIN - HEMOFARM A.D. Vršac

BRp kapi za oči, rastvor [0,3 mg/ml] 10 ml

S01GA51 *nafazolin, borna kiselina*

Doziranje: kao za nafazolin S01GA01. Borna kiselina posjeduje blago antiseptičko djelovanje i primjenjuje se kao pufer u kapima za oči.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

PROCULIN - ALKALOID AD

BRp kapi za oči, rastvor [(0,3 + 15) mg/ml] 10 ml

S01GX Ostali antialergici**S01GX05 Iodoksamid**

Doziranje: Odrasli i djeca preko 2 godine starosti: 1 do 2 kapi ukapati u konjunktivalnu vrećicu 4 puta dnevno u jednakim vremenskim intervalima.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

ALOMIDE - ALCON PHARMACEUTICALS LTD

Rp kapi za oči [1,78 mg/ml] 5 ml

S01GX09 olopatadin

Doziranje: Uobičajena doza je jedna kap u konjunktivalnu vrećicu zahvaćenog oka dva puta na dan (svakih 8 sati). Kapi se mogu uzimati do 4 mjeseca. Ako se istovremeno koristi više oftalmoloških lijekova, primjenu treba odovijiti pet do deset minuta. Lijek se smije davati djeci (u dobi od 3 godine i starijim), a dozira se jednako kao u odraslih. Ne očekuje se da bi pri oslabljenoj funkciji jetre ili bubrega dozu trebalo prilagođavati.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

OPATANOL - ALCON PHARMACEUTICALS LTD

Rp kapi za oči [1mg / ml] 5 ml

S01K Hirurška pomoćna sredstva**S01KA Visko-elastične supstance****S01KA02 hipromeloza**

Doziranje: U konjunktivalnu kesu se ukapava 1-2 kapi tri puta na dan.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

HEMODROPS - HEMOFARM A.D. Vršac

BRp kapi za oči [5 mg/ml] 10 ml

ISOPTO TEARS - ALCON PHARMACEUTICALS LTD

Rp kapi za oči [5 mg/ml] 15 ml

S01X Ostali lijekovi za liječenje bolesti oka**S01XA Ostali lijekovi za liječenje bolesti oka****S01XA deproteiniziran hemodijalizat teleće krvi**

Doziranje: Jedna kap 3-4 puta na dan. Lijek ukapati iz tube neposredno u oboljelo oko. Nakon primjene tubu odmah zatvoriti. Tokom rukovanja, ne doticati vrh tube prstima.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

SOLCOSERYL - ALKALOID AD

Rp gel za oči [8,30 mg/g] 5 g gela

S01XA20 azapentacen polisulfonat-natrijum

Doziranje: Ukapati 3-5 puta na dan po 2 kapi u oboljelo oko. Preporučuje se nastavak terapije i ukoliko dođe do brzog poboljšanja.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

QUINAX - ALCON PHARMACEUTICALS LTD

Rp kapi za oči [0,15 mg/ml] 15 ml

S02 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI UHA (OTOLOGICI)

S02C Kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji

S02CA Kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji

S02CA01 prednizolon, tirotricin, tetrakain

Doziranje: U oboljelo uho ukapati 4 do 5 kapi u razmacima od 1 h ili natopiti sterilnu gazu i utisnuti je u kanal.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

OTOL H - HEMOFARM A.D. Vršac

Rp kapi za uši, rastvor [(1,0 + 0,1 + 10,0)mg/g] 10 g

S03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA I UHA

S03A Antiinfektivi

S03AA Antiinfektivi

S03AA ofloksacin

Doziranje: Prva dva dana 1-2 kapi na svaki sat, a narednih 2-3 dana 1-2 kapi, u jednakim razmacima, 6-8 puta na dan. Trajanje liječenja treba da bude najmanje 7 dana (uz dodatna 3 dana nakon prestanka lučenja gnojnog sekreta), ali ne duže od 14 dana.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

UNIFLOX 0,3% - UNIMED PHARMA s.r.o.

Rp kapi za uši/oči, rastvor [3 mg/ml] 10 ml

S03C Kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji

S03CA Kortikosteroidi i antiinfektivi u kombinaciji

S03CA01 deksametazon, neomicin

Doziranje: 3 puta dnevno 2 do 4 kapi.

REGISTROVANI LIJEKOVI:

DEXAMETHASON-NEOMYCIN - GALENIKA a.d.

Rp kapi za uši/oči, rastvor [(1,0 + 3,5) mg/ml] 5 ml

NEODEKSACIN - HEMOFARM A.D. Vršac

Rp kapi za uši/oči, rastvor [(1,0 + 3,5) mg/ml] 10 ml